

承認番号:

(印刷後、薬剤部へ提出)

(MSI-Highがん001)【240mg】オブジーボ 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

オブジーボ療法		2週毎	
	day1		day15
オブジーボ(ニボルマブ)	↓		↓
オブジーボ	1回 240mg/body		
注意！下記の場合は、オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用			
→オブジーボのレジメンフォルダ内『副作用』インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	オブジーボ	240mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
14病日に休薬完了				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS	100mg ()mg	2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				