

(腎がん004)オブジーボ・ヤーボイ
化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

オブジーボ+ヤーボイ療法		3週毎	
	1回目		5回目
オブジーボ(ニボルマブ)	↓	↓	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	↓	↓	↓
	3週間	3週間	3週間
			2週間
			2週間
			...
オブジーボ	240mg/body		
ヤーボイ	1mg/kg		
※3週間間隔 4回まで併用。5回目以降はオブジーボ単独のレジメンを使用			
注意！下記の場合は、オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合	インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用 →オブジーボのレジメンフォルダ内『副作用』インフリキシマブBS』を使用		
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合	エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与 →『(その他の肺がん003)CPA/パルス』を使用		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
*CV・PICC・ポートでの投与不可				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml	30分	点滴
	オブジーボ	240mg		
Rp.3	生理食塩液	50ml	30分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml★	30分	点滴
	ヤーボイ	()mg		
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
★生食30mLを破棄し、生食20mLにヤーボイを調製(濃度1mg~4mg/ml)				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml	2時間	点滴
	インフリキシマブBS	100mg ()mg		
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	2病日に休薬完了