

(腎がん007)【400mg】キイトルーダ・インライタ  
化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

キイトルーダ・インライタ療法		
	day1	day43
キイトルーダ (ペンブロリズマブ)	↓	↓
インライタ (アキシチニブ)	→	
キイトルーダ	400mg/body	6週毎
インライタ錠	1回5mg 1日2回	連日
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。		
レスタミンコーワ錠10mg	5錠	
カロナール錠500mg	1~2錠	をキイトルーダ投与前90分(±30分)内服
注意！下記の場合は、キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダーできません。		
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合	インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与	間質性肺炎には適応外使用 →キイトルーダのレジメンフォルダ内『副作用』インフリキシマブBS』を使用
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合	エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m <sup>2</sup> 単回投与	→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	400mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
42病日に休薬完了				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS	100mg ( )mg	2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				