

(胆・膵がん008)ザノサーWeekly

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ザノサーWeekly療法		1週毎		
	day1	day8	day15
ザノサー	↓	↓	↓	
【参考】				
ザノサー	1000mg/m ²			
<減量基準> 減量が必要な場合は、1段階(250mg/m ²)ずつ減量すること。				
ただし、750mg/m ² 未満での投与及び減量後の増量は行わない。				
<増量基準> 1回1000mg/m ² で投与を開始し、12週目までの忍容性が良好な場合には、				
1回1250mg/m ² に増量可。さらに18週目までの忍容性が認められる場合には				
最大1回1500mg/m ² まで増量可				

※day1のイメンド(125mg)は処置、day2・day3のイメンド(80mg)は処方

①day01			
療法プロトコール			
Rp.	イメンド 125mg	朝	内服処置
Rp.1	ラクテック 500ml	2時間	点滴
Rp.2	生理食塩液 100ml デキサート(3.3mg) 2A アロキシ 1A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液 100ml ザノサー ()mg	30分	点滴
Rp.4	生理食塩液 250ml	1時間	点滴
			7病日に休薬完了
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄