

(乳がん005)PTX・HER

## 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

タキソール＋ハーセプチン療法				28日/1コース				
				次コース				
	day1	8	15	22	1	8	15	22
タキソール	(↓)	↓	↓		↓	↓	↓	
ハーセプチン	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
レジメンはday1にPTX入りで初期設定								
【参考】								
タキソール	60～80mg/m <sup>2</sup> /日			→レジメンは80mg/m <sup>2</sup> で初期設定				
ハーセプチン	2mg/kg/日			(初回のみ 4mg/kg/日)				
*ハーセプチン: 2回目以降、投与時間30分に短縮可								

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルタールート使用			
①PTX+HER初回			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	ラニチジン	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml	
	タキソール	( )mg	1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	
	ハーセプチン	( )mg	90分 点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分 点滴
7病日に休薬完了			
②PTX+HER2回目以降			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	ラニチジン(ザンタック)	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml	
	タキソール	( )mg	1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	
	ハーセプチン	( )mg	30分 点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分 点滴
7病日に休薬完了			
③HERのみ2回目以降			
Rp.1	生理食塩液	50ml	ルートキープ
Rp.2	生理食塩液	250ml	
	ハーセプチン	( )mg	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分 点滴
7病日に休薬完了			