

(大腸がん006)IRIS内服・Bev

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

アバスチン・IRIS療法	35日/1コース		
	1日目	15日目	次コース 36日目
アバスチン	↓	↓	↓
カンプト	↓	↓	↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	← (3週投与) →		(2週休薬)
【参考】			
アバスチン	5mg/kg/日		
カンプト	80mg/m <sup>2</sup> /日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	~1.25	80mg分2
		1.25~1.50	100mg分2
		1.50~	120mg分2

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

①day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	( )mg	※90分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	500ml		
	カンプト	( )mg	90分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
14病日に休薬完了				
②day01 (2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定				
③day15				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	( )mg	※60分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	500ml		
	カンプト	( )mg	90分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可				