

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

アバスチン・m-FOLFOX 6(進行・再発大腸癌)

14日/1コース

5-FU 急速静注 15分

I-LV

アバスチン

L-OHP

5-FU CVCポートより46h持続静注

30～90分

120分

【参考】

アバスチン

5mg/kg/day

レボホリナート

200mg/m²

オキサリプラチン

85mg/m²

5-FU

急速静注:400mg/m²持続静注:2400～3000mg/m²

→初期設定:2400

※アバスチン投与時間:初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。				
①day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩水	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩水	100ml		
	アバスチン	()mg	※90分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml		
	レボホリナート	()mg	120分	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml		
	オキサリプラチン	()mg	120分	点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	()mg	15分で	急速静注
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.7	生理食塩液50ml	★50ml		
	5-FU	()mg		
インフューザーポンプより			46時間持続	
14病日に休薬完了				
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する 全量を変更する場合は、★の生食の投与量を変更し、フリーコメントを削除する				
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定				

Rp.3とRp.4
同時に開始