

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

modified FOLFOX 6(進行・再発大腸癌)

14日/1コース

5-FU 急速静注 15分



I-LV

L-OHP

5-FU CVCポートより46h持続静注

120分

【参考】

レボホリナート 200mg/m²エルプラット 85mg/m²5-FU 急速静注: 400mg/m²持続静注: 2400~3000mg/m² → 初期設定: 2400

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。

day01

療法プロトコール

Rp.1	生理食塩水	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	5%ブドウ糖	250ml		
	レボホリナート	()mg	2時間	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml		
	エルプラット	()mg	2時間	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	()mg	15分で	急速静注
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.6	生理食塩液50ml	50ml★		
	5-FU	()mg		
インフューザーポンプより				46時間持続

Rp.2とRp.3
同時に開始

14病日に休薬完了

★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する

全量を変更する場合は、★の生食の投与量を変更し、フリーコメントを行削除する