

(大腸がん021)mFOLFOX6・セツキシマブ 化学療法登録書

①③閉鎖式パル輸液セット (フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

アービタックス・mFOLFOX6		14日/1コース	
			次コース
	day1	day8	day15
アービタックス	↓	↓	↓
エルプラット	↓		↓
レボホリナート	↓		↓
5-FU	↓		↓
【参考】			
アービタックス	初回投与量400mg/m ² 、維持投与量250mg/m ²		
レボホリナート	200mg/m ² /day		
エルプラット	85mg/m ²		
5-FU	急速静注: 400mg/m ² /day		
	持続静注: 2400mg/m ² /day		
* アービタックス: 初回は生理食塩液500mlで120分投与、2回目以降は250mlで60分投与			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。			
①FOLFOX+セツ初回			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩水	100ml	
	アロキシ	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	500ml	
	アービタックス	()mg	2時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	2時間 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	エルプラット	()mg	2時間 点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★	インフューザーポンプより
	5-FU	()mg	46時間持続
			7病日に休薬完了
②セツのみ2回目以降			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩水	100ml	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml	
	アービタックス	()mg	1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
			7病日に休薬完了
③FOLFOX+セツ2回目以降			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩水	100ml	
	アロキシ	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml	
	アービタックス	()mg	1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	2時間 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	エルプラット	()mg	2時間 点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★	インフューザーポンプより
	5-FU	()mg	46時間持続
			7病日に休薬完了
★(フリーコメント)生食で全量100mlにする→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する 全量を変更する場合は、★の生食の投与量を変更し、フリーコメントを削除する			