

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

サイラムザ＋FOLFIRI療法 14日/1コース

	day1	day15
サイラムザ	↓	↓
カンプト	↓	↓
レボホリナート	↓	↓
5-FU	↓	↓
【参考】		
サイラムザ(ラムシルマブ)	8mg/kg	
レボホリナート	200mg/m ² /day	
カンプト	150mg/m ² /day	
5-FU	急速静注 400mg/m ² /day	
	持続静注 2400mg/m ² /day	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。

*サイラムザはインラインフィルタを使用すること。

①day01

Rp.0	レスタミンコーワ錠	5錠		内服処置
Rp.1	生理食塩液	50ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	サイラムザ	()mg	1時間	点滴
	※薬剤部で全量250mlにする			
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴(フラッシュ)
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml		
	レボホリナート	()mg	2時間	点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml		
	カンプト	()mg	2時間	点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	()mg	15分で	急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★		インフューザーポンプより
	5-FU	()mg	46時間持続	

Rp.4とRp.5
同時に開始

14病日に休薬完了

②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き

★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する
全量を変更する場合は、★の生食の投与量を変更し、フリーコメントを行削除する