

(大腸がん026)IRIS・Bev

## 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

IRIS・Bev療法【4週サイクル S-1,IRI,Bev】28日/1コース			
	1日目	15日目	次コース 29日目
アバスタチン	↓	↓	↓
カンプト	↓	↓	↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	(2週投与) ←-----→ (2週休薬)		
【参考】			
アバスタチン	5mg/kg/日		
カンプト	100mg/m <sup>2</sup> /日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	~1.25	80mg分2
		1.25~1.50	100mg分2
		1.50~	120mg分2

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

①day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスタチン	( )mg	※90分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	500ml		
	カンプト	( )mg	90分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
14病日に休薬完了				
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
Rp.2 アバスタチン投与時間※60分で設定				
③day15				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスタチン	( )mg	※60分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	500ml		
	カンプト	( )mg	90分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
14病日に休薬完了				
※アバスタチン投与時間:初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可				