

閉鎖式パル輸液セット(フィルター付)
と閉鎖式パル輸液セットの2本

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

| FP(stage I)+RT療法 | | 28日/1コース | |
|------------------|--|----------|--------|
| | Stage I 食道癌 | | 2コース投与 |
| | | | 次コース |
| day | 1 | 2 | 3 |
| | ↓ | ↓ | ↓ |
| 5-FU | ↓ | ↓ | ↓ |
| シスプラチン | ↓ | ↓ | ↓ |
| | | | 29 |
| | | | ↓ |
| | | | ↓ |
| 【参考】 | | | |
| 5-FU | 700mg/m ² /day (350mg/m ² × 2) | | 4日投与 |
| シスプラチン | 70mg/m ² /日 | | |

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

| 【day01~day05入院】 | | | |
|--|--|------|------------------|
| ※ day1、day2、day3のイメンドは処置 | | | |
| ★全量が700mlを超える場合は、超過分を本体の生食より抜き取り、全量700mlに調整する。 | | | |
| day01 | | | |
| Rp.0 | イメンド 125mg | 朝 | 内服処置 |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml アロキシ 1A デキサート 3A | 30分 | 点滴 10:00 |
| Rp.2 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg *スピロス付ける | 12時間 | 点滴 10:30 |
| Rp.3 | ラクテック 500ml Rp.1とRp.3同時に開始 | 2時間 | 点滴 10:00 |
| Rp.4 | 生理食塩液 ★【500ml】 シスプラチン ()mg | 2時間 | 点滴 12:00 |
| Rp.5 | マンニトール 300ml | 2時間 | 点滴 14:00 |
| Rp.6 | ラクテック 500ml | 2時間 | 点滴 16:00 |
| Rp.7 | ソルデム3A 500ml | 2時間 | 点滴 18:00 |
| Rp.8 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg | 12時間 | 点滴 22:30 Rp.2終了後 |
| day02・day03 | | | |
| Rp.0 | イメンド 80mg | 朝 | 内服処置 |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml デキサート 2A | 30分 | 点滴 10:00 |
| Rp.2 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg | 12時間 | 点滴 10:30 |
| Rp.3 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg | 12時間 | 点滴 22:30 |
| day04 | | | |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml デキサート 2A | 30分 | 点滴 10:00 |
| Rp.2 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg | 12時間 | 点滴 10:30 |
| Rp.3 | ポタコールR 500ml 5-FU ()mg | 12時間 | 点滴 22:30 |
| day05 | | | |
| Rp.1 | 生理食塩液 50ml | 15分 | 点滴 10:30 |
| 28病日に休薬完了 | | | |