

(胃がん006)PTX・内服S-1

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

タキソール+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム療法 21日/1コース			
	day1	day8	day22
タキソール	↓	↓	↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	14日投与		7日休薬
【参考】			
タキソール	50mg/m ² /日		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	~1.25	80mg分2
		1.25~1.50	100mg分2
		1.50~	120mg分2

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルタールート使用			
day01			
療法プロトコール			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	ラニチジン	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml	
	タキソール ()mg		1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分 点滴
7病日に休薬完了			
day08			
療法プロトコール			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	ラニチジン	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml	
	タキソール ()mg		1時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分 点滴
14病日に休薬完了			