

(胃がん011)PTX・内服S-1・PTX腹腔内
化学療法登録書

【適応外使用】
同意書確認

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

タキソール+テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム／タキソール腹腔内投与 21日/1コース			
	day1	day8	day22
タキソール点滴静注	↓	↓	↓
タキソール腹腔内投与	↓	↓	↓
テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	← 14日投与 →		← 7日休薬 →
【参考】			
タキソール点滴静注	50mg/m ² /日		
タキソール腹腔内投与	20mg/m ² /日		
テガフル・キメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	~1.25	80mg分2
		1.25~1.50	100mg分2
		1.50~	120mg分2

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* 点滴、腹腔内投与とも、インラインフィルタールート使用				
day01	薬品名(商品名)	投与量	投与速度	投与方法
	レスタミンコーワ錠	5錠		内服処置
Rp.1	生理食塩液 100ml	100ml		
	ラニチジン 50mg	1A		
	デキササート 3.3mg	2A	30分	点滴
Rp.2	ソルデム1 200ml	200ml		
	タキソール	()mg	60分	点滴
Rp.3	生理食塩液 50ml	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液 50ml	50ml	15分	Rp.4~6 腹腔内投与・適応外使用 Rp.2 タキソール点滴と同時に開始
Rp.5	生理食塩液 500ml	500ml	60分	
Rp.6	生理食塩液 50ml	50ml	15分	
7病日に休薬完了				
day08	薬品名(商品名)	投与量	投与速度	投与方法
	レスタミンコーワ錠	5錠		内服処置
Rp.1	生理食塩液 100ml	100ml		
	ラニチジン 50mg	1A		
	デキササート 3.3mg	2A	30分	点滴
Rp.2	ソルデム1 200ml	200ml		
	タキソール	()mg	60分	点滴
Rp.3	生理食塩液 50ml	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液 50ml	50ml	15分	Rp.4~6 腹腔内投与・適応外使用 Rp.2 タキソール点滴と同時に開始
Rp.5	生理食塩液 500ml	500ml	60分	
Rp.6	生理食塩液 50ml	50ml	15分	
14病日に休薬完了				