承認番号:27110625

(胃がん018)PTX・HER 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

PTX · HER信	并用療	法								
(元JFMC45)										
	day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	day57	
パクリタキセル	1	1	1		1	Ţ	1		1	
ハーセプチン	Ţ			Ţ			Ţ			
選択するレジメン	1	2	2	3	2	2	4		2	
【参考】										
パクリタキセル	3投1休	80mg/m ²								
ハーセプチン	3週毎	6mg/kg/E	6mg/kg/日(初回のみ 8mg/kg/日)							
※開始後は、それぞれ独立した投与スケジュールで投与する。②③④から適切なレジメンを選択してください。										
* ハーセプチン:	2回目以	J降、投与	時間30分	た短縮す	可					

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

	+HER初回 □レスタミンコーワ錠	 5錠	内服処	 罢
Rp.		內加及处		
Rp.1	生理食塩液			
	ラニチジン	201	F >+-	
	デキサート	30分	点周	
Rp.2	ソルデム1 2			
	パクリタキセル	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 2	50ml		
	ハーセプチン() mg	90分	点滴
Rp.4	生理食塩液 5	0ml	15分	占油
т.р. т	工程及弧//	OTTI		に休薬完
2PTX	のみ		7 / 175	
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処	置
Rp.1	生理食塩液			
	ラニチジン	100ml 1A		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	ソルデム1 2	00ml		
rtp.z		()mg	1時間	占油
D 0		, , ,		
Rp.3	生理食塩液 5	0ml	15分	
⊘⊓ED	のみ2回目以降		/病日	に休薬完
Rp.1		0ml	ルートキ	
Rp.2		50ml	70 11	
rtp.Z	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) mg	30分	占海
Rp.3	生理食塩液 5	0ml	15分	*******
ADTY			7病日	に休薬完
\sim	+HER2回目以降 レスタミンコーワ錠	 5錠	内服処	署
Rp.		5 <u>乗</u> 100ml	אל אות וליו	巨
Rp.1	生理食塩液			
	ラニチジン	1A	201	F >**
	デキサート	2A	30分	点凋
Rp.2		00ml		
	パクリタキセル	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 2	50ml		
	ハーセプチン()mg	30分	点滴
Rp.4	生理食塩液 5		15分	
ι \μ. τ	工程及塩/双 3	OIIII		<u> </u>