

承認番号:

(印刷後、薬剤部へ提出)

(悪性黒色腫003)オブジーボ・ヤーボイ 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

オブジーボ+ヤーボイ療法		3週毎	
	1回目		5回目
オブジーボ(ニボルマブ)	↓	↓	↓
ヤーボイ(イピリムマブ)	↓	↓	↓
	3週間	3週間	3週間
			4週間
			4週間
			...
オブジーボ	80mg/body (day85以降480mg)		
ヤーボイ	3mg/kg		
※3週間間隔 4回まで併用。5回目以降はオブジーボ単独のレジメンを使用			
注意！下記の場合は、オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合	インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用 →オブジーボのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用		
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合	エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与 →『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	オブジーボ	80mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml★		
	ヤーボイ	()mg	90分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
★生食30mLを破棄し、生食20mLにヤーボイを調製(濃度1mg~4mg/ml)				
day85(5コース目)以降はオブジーボ単剤レジメンを使用				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS	100mg ()mg	2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				