

(非小肺がん004)カルボ・アリムタ・Bev
化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

| カルボプラチン・アリムタ・アバスチン併用療法 | | | |
|---|----------------------|--------|---------------|
| 21日/1コース | | | |
| | 1日目 | 22日目 | 3~6コース投与後、 |
| カルボプラチン | ↓ | ↓ | PDが認められていなければ |
| アリムタ | ↓ | ↓ | PDが認められるまで |
| アバスチン | ↓ | ↓ | Bev単独で投与継続 |
| 【参考】 | | | |
| カルボプラチン | AUC=4~6 | →初期設定5 | |
| アリムタ | 500mg/m ² | | |
| アバスチン | 15mg/kg | | |
| アリムタ投与1週間前にフレズミンS 1000μg、 | | | |
| 筋肉内投与、9週間毎 | | | |
| 調剤用パンピタン末 1g/day 連日経口投与 | | | |
| ※アバスチン投与時間:初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可 | | | |

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

| ※day1のイメンド(125mg)は処置、day2以降のイメンド(80mg)は処方 | | | |
|---|-----------------|------------|------|
| ①1回目 | | | |
| Rp. | イメンドcap (125mg) | 朝 | 内服処置 |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml | | |
| | デキサート 1A | | |
| | アロキシ 1A | 20分 | 点滴 |
| Rp.2 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アバスチン ()mg | 90分 | 点滴 |
| Rp.3 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アリムタ ()mg | 500ml/h | 点滴 |
| | | ポンプ使用、約10分 | |
| Rp.4 | 生理食塩液 100ml | 30分 | 点滴 |
| Rp.5 | ソルデム3A 200ml | | |
| | カルボプラチン ()mg | 1時間 | 点滴 |
| Rp.6 | 生理食塩液 50ml | 15分 | 点滴 |
| 21病日に休薬完了 | | | |
| ②2回目 | | | |
| Rp. | イメンドcap (125mg) | 朝 | 内服処置 |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml | | |
| | デキサート 1A | | |
| | アロキシ 1A | 20分 | 点滴 |
| Rp.2 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アバスチン ()mg | ※60分 | 点滴 |
| Rp.3 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アリムタ ()mg | 500ml/h | 点滴 |
| | | ポンプ使用、約10分 | |
| Rp.4 | 生理食塩液 100ml | 30分 | 点滴 |
| Rp.5 | ソルデム3A 200ml | | |
| | カルボプラチン ()mg | 1時間 | 点滴 |
| Rp.6 | 生理食塩液 50ml | 15分 | 点滴 |
| 21病日に休薬完了 | | | |
| ③3回目以降 | | | |
| Rp. | イメンドcap (125mg) | 朝 | 内服処置 |
| Rp.1 | 生理食塩液 100ml | | |
| | デキサート 1A | | |
| | アロキシ 1A | 20分 | 点滴 |
| Rp.2 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アバスチン ()mg | ※30分 | 点滴 |
| Rp.3 | 生理食塩液 100ml | | |
| | アリムタ ()mg | 500ml/h | 点滴 |
| | | ポンプ使用、約10分 | |
| Rp.4 | 生理食塩液 100ml | 30分 | 点滴 |
| Rp.5 | ソルデム3A 200ml | | |
| | カルボプラチン ()mg | 1時間 | 点滴 |
| Rp.6 | 生理食塩液 50ml | 15分 | 点滴 |
| 21病日に休薬完了 | | | |