

## (非小肺がん023)アリムタ・Bev

## 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

アリムタ+アバスチン療法		21日/1コース	
	day1		day22
アリムタ	↓		↓
アバスチン	↓		↓
【参考】			
アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>		
アバスチン	15mg/kg		
アリムタ投与1週間前にフレズミンS 1000 μg、筋肉内投与、9週間毎			
調剤用パンプタン末 1g/day 連日経口投与			
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可			

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

## 薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①1回目				
Rp.1	生理食塩液	100mL		
	デキサート	2A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100mL		
	アバスチン	( )mg	90分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100mL		
	アリムタ	( )mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
②2回目				
Rp.1	生理食塩液	100mL		
	デキサート	2A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100mL		
	アバスチン	( )mg	※60分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100mL		
	アリムタ	( )mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
③3回目以降				
Rp.1	生理食塩液	100mL		
	デキサート	2A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100mL		
	アバスチン	( )mg	※30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100mL		
	アリムタ	( )mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				