

閉鎖式パル輸液セット

(印刷後、薬剤部へ提出)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ナベルビン・アバスチン療法

21日/1コース

次コース

day1

day8

day22

ナベルビン

↓

↓

↓

アバスチン

↓

↓

【参考】

ナベルビン

25mg/m²

アバスチン

15mg/kg

※アバスチン投与時間:初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①day01					
Rp.1	生理食塩液	100mL			
	デキサート	2A			
	ラニチジン	1A	30分	点滴	
Rp.2	生理食塩液	100mL			
	アバスチン	()mg	1時間30分	点滴	
Rp.3	生理食塩液	50ml			
	ナベルビン	()mg	約5分(全開)	点滴	
Rp.4	生理食塩液	250ml	30分	点滴	

7病日に休薬完了

②day08					
Rp.1	生理食塩液	100ml			
	デキサート	2A			
	ラニチジン	1A	30分	点滴	
Rp.2	生理食塩液	50ml			
	ナベルビン	()mg	約5分(全開)	点滴	
Rp.3	生理食塩液	250ml	30分	点滴	

14病日に休薬完了

③day01(2回目)					
Rp.1	生理食塩液	100mL			
	デキサート	2A			
	ラニチジン	1A	30分	点滴	
Rp.2	生理食塩液	100mL			
	アバスチン	()mg	※1時間	点滴	
Rp.3	生理食塩液	50ml			
	ナベルビン	()mg	約5分(全開)	点滴	
Rp.4	生理食塩液	250ml	30分	点滴	

7病日に休薬完了

④day01(3回目以降)					
Rp.1	生理食塩液	100mL			
	デキサート	2A			
	ラニチジン	1A	30分	点滴	
Rp.2	生理食塩液	100mL			
	アバスチン	()mg	※30分	点滴	
Rp.3	生理食塩液	50ml			
	ナベルビン	()mg	約5分(全開)	点滴	
Rp.4	生理食塩液	250ml	30分	点滴	

7病日に休薬完了