

(非小肺がん042)キイトルーダ 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

キイトルーダ療法		3週毎	
	day1		day22
キイトルーダ(ペンブロリズマズ)	↓		↓
キイトルーダ	200mg/body		
※PD-L1 強陽性(TPS \geq 50%)【1次治療】		PD-L1 陽性(TPS \geq 1%)【2次治療】	
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠			
カロナール錠500mg 1~2錠	をキイトルーダ投与前90分(±30分)内服		
注意！下記の場合は、キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でレミケードを使用する場合			
レミケード(インフリキシマブ)	1回5mg/kg 単回投与	間質性肺炎には適応外使用	
→キイトルーダのレジメンフォルダ内『【副作用】レミケード』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド)	適応外使用	1回500mg/m ²	単回投与
→『(その他の肺がん003)CPA/パルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	200mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
【副作用】レミケード				
注意！キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	レミケード100mg ()mg		2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				