

# (非小肺がん042)キイトルーダ 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

キイトルーダ療法	3週毎	
	day1	day22
キイトルーダ(ペンブロリズマズ)	↓	↓
キイトルーダ	200mg/body	
※PD-L1強陽性(TPS≥50%)【1次治療】	PD-L1陽性(TPS≥1%)【2次治療】	
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。		
レスタミンコーワ錠10mg 5錠		
コロナール錠500mg 1～2錠	をキイトルーダ投与前90分(±30分)内服	
<b>注意！下記の場合は、キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。</b>		
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合	インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用 →キイトルーダのレジメンフォルダ内『副作用』インフリキシマブBS』を使用	
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合	エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m <sup>2</sup> 単回投与 →『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用	

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	200mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS100mg ( )mg	2時間		点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄