

(非小肺がん043)テセントリク

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

テセントリク療法		3週毎	
	day1		day22
テセントリク(アテゾリズマブ)	↓		↓
テセントリク	1200mg/body		
【参考】			
※テセントリク: 2回目以降、投与時間30分に短縮可			
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠			
カロナール錠500mg 1~2錠 をテセントリク投与前90分(±30分)内服			
注意! 下記の場合は、テセントリクの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合 インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用 →テセントリクのレジメンフォルダ内『副作用』インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合 エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与 →『(その他の肺がん003)CPA/パルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
①初回: day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	テセントリク	1200mg	60分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
* インラインフィルター使用				
②2回目以降: day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	テセントリク	1200mg	※30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意! テセントリクの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS100mg ()mg		2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
2病日に休薬完了				