承認番号：27110899

（印刷後、薬剤部へ提出）

（非小肺がん047）カルボ・PTX・キイトルーダ
化学療法登録書

薬剤部調製用（医師は投与量入力不要）

患者ID　@PATIENTID

患者氏名　@PATIENTNAME

診療科　@USERSECTION　　医師名　@USERNAME

レジメン開始予定日（必ず入力）　　年　　月　　日

カルボプラチン＋パクリタキセル＋キイトルーダ

21日/1コース

	1日目	22日目
カルボプラチン	↓	↓
パクリタキセル	↓	↓
キイトルーダ	↓	↓

【参考】

カルボプラチン	AUC＝6　適宜減量
パクリタキセル	200mg/㎡/日
キイトルーダ	200mg

Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。

カロナール錠500mg　1～2錠　をキイトルーダ投与前90分（±30分）内服

注意！下記の場合は、キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。

◆副作用（間質性肺炎・炎症性腸疾患）でインフリキシマブBSを使用する場合
　インフリキシマブBS　1回5mg/kg　単回投与　　間質性肺炎には適応外使用
　→キイトルーダのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用

◆副作用（間質性肺炎）でエンドキサンを使用する場合
　エンドキサン（シクロホスファミド）適応外使用　1回500mg/㎡　単回投与
　→『（その他の肺がん003）CPAパルス』を使用

*レジメン開始後、投与スケジュール変更（休薬・減量等）コメント欄

※day1のイメンド（125mg）は処置、day2以降のイメンド（80mg）は処方

＊インラインフィルタールート使用

①day01

療法プロトコール			
Rp.	イメンドcap　（125mg）	朝	内服処置
Rp.	レスタミンコーワ錠　5錠	朝	内服処置
Rp.1	生理食塩液　100ml		
	デキサート　1A		
	ラニチジン　1A		
	アロキシ　1A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液　100ml		
	キイトルーダ　200mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液　50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液　500ml		
	パクリタキセル　（　　）mg	3時間	点滴
Rp.5	ソルデム3A　200ml		
	カルボプラチン　（　　）mg	1時間	点滴
Rp.6	生理食塩液　50ml	15分	点滴

21病日に休薬完了

②day01（2回目以降）・・・登録書・説明書抜き