

## (川崎病001)レミケード

## 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

## レミケード (川崎病の急性期)

	day1
レミケード(インフリキシマブ)	↓
<b>【参考】</b>	
レミケード(川崎病)	1回5mg/kg 単回投与
維持輸液の側管から投与	
本体を止めて生理食塩液で前後フラッシュ	

## \* インラインフィルター使用

## ①体重25kg未満

Rp.1	生理食塩液	20ml	フラッシュ
Rp.2	生理食塩液	50ml	
	レミケード100mg	( )mg	5時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	20ml	フラッシュ

28病日に休薬完了

## ②体重25kg以上

Rp.1	生理食塩液	20ml	フラッシュ
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	レミケード100mg	( )mg	5時間 点滴
Rp.3	生理食塩液	20ml	フラッシュ

28病日に休薬完了

一連の治療期間内に再燃した場合の再投与は不可だが28病日に休薬完了としている  
将来、川崎病の再発や他の疾患での投与は可

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄