

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

(印刷後、薬剤部へ提出)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

FOLFIRINOX療法		14日/1コース	
		5-FU 急速静注 15分	
	I-LV		
オキサリプラチン	CPT-11	5-FU CVCポートより46時間持続	
120分	120分		
【参考】	オキサリプラチン	85mg/m ²	
	レボホリナート	200mg/m ²	
	カンプト	150~180mg/m ² /day →初期設定:150	
	5-FU	急速静注 400mg/m ²	
		持続静注 2400mg/m ²	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

※メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。			
※day2・day3・day4 デカドロン錠0.5mg 16錠/日 分2 朝食食後			
①day01(入院)			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	アロカリス	1V	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml	
	オキサリプラチン	()mg	2時間 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	2時間 点滴
Rp.5	生理食塩液	250ml	
	カンプト	()mg	2時間 点滴
Rp.6	生理食塩液	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★	
	5-FU	()mg	
インフューザーポンプより			46時間持続
Rp.9	生食シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
14病日に休薬完了			
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する			
全量を変更する場合は、★の生食の投与量を変更し、フリーコメントを行削除する			
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き			