

承認文書:

(胆・膵がん012)キイトルーダ・GC

化学療法登録書

閉鎖式パル輸液セット

day1 フィルターあり

day8 フィルターなし

(印刷後、薬剤部へ提出)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

キイトルーダ+GC療法		21日/1コース	
			次コース
	day1	day8	day22
キイトルーダ	↓		↓
CDDP	↓	↓	↓
ゲムシタビン	↓	↓	↓
【参考】			
キイトルーダ	200mg/body		
CDDP	25mg/m ²		
ゲムシタビン	1000mg/m ²		
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠			
カロナール錠500mg 1～2錠 をキイトルーダ投与前90分(±30分)内服			
注意！下記の場合は、キイトルーダ+GCの休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用			
→キイトルーダ+GCのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* キイトルーダはインラインフィルター使用				
①day01				
療法プロトコル				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	200mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	ラクテック	500ml	60分	点滴
Rp.5	生理食塩液	100ml		
	アロカリス	1V		
	パロノセトロン	1V		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.6	生理食塩液	500ml		
	シスプラチン	()mg	60分	点滴
Rp.7	生理食塩液	100ml		
	ゲムシタビン	()mg	30分	点滴
Rp.8	生理食塩液	500ml	60分	点滴
			7病日に休薬完了	
②day08				
療法プロトコル				
Rp.1	ラクテック	500ml	60分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アロカリス	1V		
	パロノセトロン	1V		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	500ml		
	シスプラチン	()mg	60分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	ゲムシタビン	()mg	30分	点滴
Rp.5	生理食塩液	500ml	60分	点滴
			14病日に休薬完了	
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！キイトルーダ+GCの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS100mg ()mg	2時間		点滴
	* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下			
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
			2病日に休薬完了	