

(大腸がん002)CPT-11・セツキシマブ

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

日

アービタックス・CPT-11		14日/1コース		
	day1	day8	day15	
アービタックス	↓	↓	↓	
イリノテカン	↓		↓	
【参考】				
アービタックス	初回投与量400mg/m ² 、維持投与量250mg/m ²			
イリノテカン	150mg/m ²			
* アービタックス: 初回は生理食塩液500mlで120分投与。2回目以降は250mlで60分投与。				

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①CPT-11+セツ初回			
療法プロトコール			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	500ml	
	アービタックス	()mg	2時間 点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖液	500ml	
	イリノテカン	()mg	1時間30分 点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分
Rp.7	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
7病日に休薬完了			
②セツのみ2回目以降			
療法プロトコール			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	
	アービタックス	()mg	1時間 点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
Rp.5	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
7病日に休薬完了			
③CPT-11+セツ2回目以降			
療法プロトコール			
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	
	アービタックス	()mg	1時間 点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml	1時間 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖液	500ml	
	イリノテカン	()mg	1時間30分 点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.7	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
7病日に休薬完了			