

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

アバスチン・m-FOLFOX 6(進行・再発大腸癌)			
		14日/1コース	
		5-FU 急速静注 15分	
		↓	
		I-LV	
アバスチン	L-OHP	5-FU CVポートより46h持続静注	
30～90分	120分		
【参考】	アバスチン	5mg/kg/day	
	レボホリナート	200mg/m ²	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
	5-FU	急速静注: 400mg/m ²	
		持続静注: 2400mg/m ²	
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。			
①day01			
療法プロトコル			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩水	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	3A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩水	100ml	
	アバスチン	()mg	※90分 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	120分 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	オキサリプラチン	()mg	120分 点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	★50ml	
	5-FU	()mg	
インフューザーポンプより			46時間持続
Rp.9	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
14病日に休薬完了			
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する			
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する			
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き			
	Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定		