

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

FOLFIRI療法		14日/1コース	
	5-FU 急速静注 15分		
I-LV			
CPT-11	5-FU CVポートより46時間持続		
120分			
【参考】	レボホリナート	200mg/m ² /day	
	イリノテカン	150～180mg/m ² /day →初期設定:150	
	5-FU	急速静注 400mg/m ² /day	
		持続静注 2400mg/m ² /day	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

※メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。					
day01					
療法プロトコール					
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用		
Rp.2	生理食塩液	100ml			
	パロノセトロン	1A			
	デキサート	2A	30分	点滴	
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml		Rp.3とRp.4 同時に開始	
	レボホリナート	()mg	2時間		点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml			
	イリノテカン	()mg	2時間		点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	100ml			
	5-FU	()mg	15分で	急速静注	
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴	
Rp.7	生理食塩液50ml	50ml★			
	5-FU	()mg			
	インフューザーポンプより		46時間持続		
Rp.8	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ		
				14病日に休薬完了	
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する					
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する					