

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

modified FOLFOX 6(進行・再発大腸癌)			
		14日/1コース	
	↓	5-FU 急速静注 15分	
I-LV			
L-OHP	5-FU CVポートより46h持続静注		
120分			
【参考】			
レボホリナート	200mg/m ²		
オキサリプラチン	85mg/m ²		
5-FU	急速静注:	400mg/m ²	
	持続静注:	2400mg/m ²	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。				
day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩水	100ml		
	パロノセトロン	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml		Rp.3とRp.4 同時に開始
	レボホリナート	()mg	2時間	
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml		
	オキサリプラチン	()mg	2時間	点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	()mg	15分で	急速静注
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.7	生理食塩液50ml	50ml★		
	5-FU	()mg		
インフューザーポンプより			46時間持続	
Rp.8	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
14病日に休薬完了				
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する				
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する				