

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

(印刷後、薬剤部へ提出)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

ベクティビックス・FOLFIRI療法		14日/1コース	
		5-FU 急速静注 15分	
	I-LV		
パニツムマブ	CPT-11	5-FU CVポートより46時間持続	
60分	120分		
【参考】	ベクティビックス	6mg/kg/day 投与間隔は2週間以上	
	レボホリナート	200mg/m ² /day	
	イリノテカン	150~180mg/m ² /day →初期設定: 150	
	5-FU	急速静注 400mg/m ² /day	
		持続静注 2400mg/m ² /day	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。			
*ベクティビックスはインラインフィルタを使用すること。			
day01			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	
	ベクティビックス	()mg	1時間 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	2時間 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	イリノテカン	()mg	2時間 点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★	
	5-FU	()mg	
インフューザーポンプより 46時間持続			
Rp.9	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
14病日に休薬完了			
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する			
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する			