

(大腸がん026)IRIS・Bev

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年月日

IRIS・Bev療法 【4週サイクル S-1,IRI,Bev】 28日/1コース				
				次コース
	1日目		15日目	29日目
アバスチン	↓		↓	↓
イリノテカン	↓		↓	↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	(2週投与)		(2週休薬)	
【参考】				
アバスチン	5mg/kg/日			
イリノテカン	100mg/m ² /日			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	～1.25	80mg分2	
		1.25～1.50	100mg分2	
		1.50～	120mg分2	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①day01	療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	パロノセトロン	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※90分	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	500ml		
	イリノテカン	()mg	90分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.6	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
			14病日に休薬完了	
②day01 (2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
	Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定			
③day15	療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	パロノセトロン	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※60分	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	500ml		
	イリノテカン	()mg	90分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.6	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
			14病日に休薬完了	
※アバスチン投与時間：初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可				