

(印刷後、薬剤部へ提出)

(大腸がん027)XELIRI・Bev内服

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

月

日

XELIRI＋アバスチン療法		21日/1コース	
			次コース
	1日目		22日目
アバスチン	↓		↓
イリノテカン	↓		↓
ゼローダ	(2週投与)		(1週休薬)
【参考】			
アバスチン	7.5mg/kg/日		
イリノテカン	200mg/m ² /日		
ゼローダ	1600mg/m ² /日		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

①day01					
療法プロトコール					
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用		
Rp.2	生理食塩液	100ml			
	アロカリス	1V			
	パロノセトロン	1A			
	デキサート	1A	30分	点滴	
Rp.3	生理食塩液	100ml			
	アバスチン	()mg	※90分	点滴	
Rp.4	5%ブドウ糖	500ml			
	イリノテカン	()mg	90分	点滴	
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴	
Rp.6	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ		
			21病日に休薬完了		
②day01 (2回目以降)・・・登録書・説明書抜き					
Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定					

※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可