## 閉鎖式パル輸液セット

## <sup>承認番号: 27110609</sup> (**胃がん010)内服XP-HER** 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ハーセプチン	ノ+XP療法	Ę	21日/1コー	-ス			
					1 00	1 00	
	. 1	day2			day22	day23	
ハーセプチン	Ţ				. ↓		
シスプラチン	. ↓				. ↓		
カペシタビン			14日投与	7 E	7日休薬		
【参考】							
ハーセプチン	6mg/kg/日	(初回 <i>0</i>	)み8mg/kg/日)				
シスプラチン	80mg/m²/d	day					
カペシタビン	2000mg/m	า์∕day	分2朝夕食後	(C法)			
	*ハーセプチン:2回目以降、投与時間30分に短縮可						

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄	

## 薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

	/01~day03入院】			
day01	薬品名(商品名)	投与量	投与速度	投与方法
Rp.1	ラクテック 500ml	500ml	IA 7 AEGA	12 37314
	硫酸Mg補正液	1A	2.5時間	点滴
Rp.2	生理食塩液 100ml	100ml		
	アロカリス 235mg	1V		
	パロノセトロン0.75mg	1V	20/\	F
	デキサート 3.3mg	3A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	90分	点滴
	ハーセプチン	( )mg	80.22	
Rp.4	生理食塩液 500ml シスプラチン	★[500ml] ( )mg	2時間	点滴
Rp.5	マンニットール 300ml	300ml	2時間	点滴
Rp.6	ラクテック 500ml	500ml	2時間	点滴
Rp.7	ソルデム3A 500ml	500ml	2時間	点滴
Rp.8	ソルデム3A 500ml	500ml	2時間	点滴
day02				
D- 1	薬品名(商品名)   ラクテック 500ml	投与量 500ml	投与速度 10時間	投与方法
Rp.1				点滴
Rp.2	ラクテック 500ml	500ml	2.5時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 100ml	100ml	***	
	デキサート 3.3mg	2A	30分	点滴
Rp.4	ソルデム3A 500ml	500ml	3時間	点滴
Rp.5	ラクテック 500ml	500ml	4時間	点滴
Rp.6	ソルデム3A 500ml	500ml	4時間	点滴
day03				
	薬品名(商品名)	投与量	投与速度	投与方法
Rp.1	ラクテック 500ml	500ml	10時間	点滴
Rp.2	ラクテック 500ml	500ml	2.5時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 100ml	100ml		
	デキサート 3.3mg	2A	30分	点滴
Rp.4	ソルデム3A 500ml	500ml	2時間	点滴
			213	<b>寅日に休薬</b> 第
[@d-:	│ /01(2回目以降)外来】			
L ∠ day day01	○1、4回日以四/77不】			
	薬品名(商品名)	投与量	投与速度	投与方法
Rp.1	ラクテック 500ml	500ml	1時間	点滴
Rp.2	ラクテック 500ml	500ml	4 n+ 88	E 15*
	硫酸Mg補正液	1A	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 100ml	100ml		
	アロカリス 235mg パロノセトロン0.75mg	1V 1V		
	デキサート 3.3mg	3A	30分	点滴
Rp.4	生理食塩液	250ml		
	エ 任 民 塩 枚 ハ 一 セプチン	( )mg	30分	点滴
Rp.5	生理食塩液 500ml	<b>★</b> [500ml]		
r.p.u	シスプラチン	( )mg	1時間	点滴
Do 6	マンニットール 300ml	300ml	30分	
Rp.6				点滴
Rp.7	ラクテック 500ml	500ml	1時間	点滴
Rp.8	ラクテック 500ml	500ml	1時間	点滴

<sup>★</sup>全量が700mlを超える場合は、超過分を本体の生食より抜き取り、全量700mlに調整する。