

承認番号：
(胃がん034)オプジーボ+mFOLFOX6
化学療法登録書

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

(印刷後、薬剤部へ提出)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

オプジーボ+mFOLFOX 6			
14日/1コース			
オプジーボ30分 5-FU 急速静注 15分			
↓ ↓			
I-LV			
L-OHP 5-FU CVポートより46h持続静注			
120分			
【参考】			
オプジーボ 240mg/日			
レボホリナート 200mg/m ²			
オキサリプラチン 85mg/m ²			
5-FU 急速静注: 400mg/m ²			
持続静注: 2400mg/m ²			
注意！下記の場合は、オプジーボ+mFOLFOX6の休薬完了を移動しなければオーダーできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用			
→オプジーボのレジメンフォルダ内【副作用】インフリキシマブBSを使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。				
day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	オブジーボ	240mg	30分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	アロカリス	1V		
	パロノセトロン	1V		
	デキサート	1A	30分	点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml		
	レボホリナート	()mg	2時間	点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	250ml		
	オキサリプラチン	()mg	2時間	点滴
Rp.7	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	()mg	15分で	急速静注
Rp.8	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.9	生理食塩液50ml	50ml★		
	5-FU	()mg		
	インフューザーポンプより		46時間持続	
Rp.10	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
				14病日に休薬完了
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する				
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！オブジーボ+mFOLFOX6の休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS100mg	()mg	2時間	点滴
	* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下			
Rp.3	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
Rp.4	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
				2病日に休薬完了