

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ビロイ+CAPOX療法		21日/1コース	
	day1		
ビロイ	↓		
オキサリプラチン	↓		
ゼローダ	← 14日投与 →		(7日休薬)
【参考】			
ビロイ	初回800mg/m ²	2回目以降600mg/m ²	
オキサリプラチン	130mg/m ² /day		
ゼローダ	2000mg/m ² /day	分2朝夕食後	
【800mg/m ² 投与时】		【600mg/m ² 投与时】	
点滴速度		点滴速度	
投与開始～30分: 75mL/h		投与開始～30分: 56mL/h	
30分～60分: 150mL/h		30分～60分: 113mL/h	
60分以降: 300mL/h		60分以降: 225mL/h	
* 悪心・嘔吐発現時はビロイを30分中断する。			
* 30分経過後、症状が改善あれば1段階速度を落として再開する			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルター使用			
*day2～3 デカドロン8mg内服			
①day01(初回)			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	アロカリス	1V	
	デキサート	3A	
	ポララミン	1A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.3	生理食塩液	500ml	投与開始～30分: 75mL/h
	生理食塩液	100ml	30分～60分: 150mL/h
	注射用水	100ml	60分以降: 300mL/h
	ビロイ	()mg	点滴
	* 全量600mlとする		
Rp.3'	生理食塩液	100ml	* ビロイ中断時に側管より開始
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	オキサリプラチン	()mg	2時間 点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分 点滴
* ビロイは薬剤部で全量600mlとなるよう調整する			21病日に休薬完了
* インラインフィルター使用			
*day2～3 デカドロン8mg内服			
②day01(2回目以降)			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	アロカリス	1V	
	デキサート	3A	
	ポララミン	1A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.3	生理食塩液	500ml	投与開始～30分: 56mL/h
	注射用水	100ml	30分～60分: 113mL/h
	ビロイ	()mg	60分以降: 225mL/h
	* 全量450mlとする		
Rp.3'	生理食塩液	100ml	* ビロイ中断時に側管より開始
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	オキサリプラチン	()mg	2時間 点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分 点滴
* ビロイは薬剤部で全量450mlとなるよう調整する			21病日に休薬完了