

承認番号:

(印刷後、薬剤部へ提出)

(胃がん041)キイトルーダ+SOX内服
化学療法登録書

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

キイトルーダ+SOX療法		21日/1コース	
	day1		
キイトルーダ	↓		
オキサリプラチン	↓		
S-1	14日投与		(7日休薬)
【参考】			
キイトルーダ	200mg/body		
オキサリプラチン	130mg/m ² /day		
S-1	体表面積	～1.25	80mg分2
		1.25～1.50	100mg分2
		1.50～	120mg分2
注意！下記の場合は、キイトルーダ+SOXの休薬完了を移動しなければオーダできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与		間質性肺炎には適応外使用	
→【副作用】インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド) 適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『(その他の肺がん003)CPA/パルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

(変更時はコメントを記入して薬剤部へ連絡)

2025/06/20版

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルター使用				
①day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	200mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	アロカリス	1V		
	デキサート	1A		
	パロノセトロン	1V	30分	点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml		
	オキサリプラチン	()mg	2時間	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			21病日に休薬完了	
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！キイトルーダ＋SOXの休薬完了を移動しなければオーダできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS	100mg ()mg	2時間	点滴
	* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下			
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
			2病日に休薬完了	

出力日時 2025/10/6 10:56