

承認番号:

(印刷後、薬剤部へ提出)

(腎がん004)オブジーボ・ヤーボイ
化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

オブジーボ+ヤーボイ療法				3週毎				
	1回目				5回目			
オブジーボ(ニボルマブ)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	
ヤーボイ(イピリウムマブ)	↓	↓	↓	↓				
	3週間	3週間	3週間	3週間	2週間	2週間	...	
オブジーボ	240mg/body							
ヤーボイ	1mg/kg							
※3週間間隔 4回まで併用。 5回目以降はオブジーボ単独のレジメンを使用								
注意！ 下記の場合は、オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。								
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合								
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用								
→オブジーボのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用								
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合								
エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与								
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用								

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用								
day01								
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴				
Rp.2	生理食塩液	100ml						
	オブジーボ	240mg	30分	点滴				
Rp.3	生理食塩液	50ml	30分	点滴				
Rp.4	生理食塩液	50ml★						
	ヤーボイ	()mg	30分	点滴				
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴	21病日に休薬完了			
★生食30mLを破棄し、生食20mLにヤーボイを調製(濃度1mg～4mg/ml)								
【副作用】インフリキシマブBS								
注意！オブジーボの休薬完了を移動しなければオーダーできません。								
* インラインフィルター使用								
Rp.1	生理食塩液	250ml						
	インフリキシマブBS	100mg ()mg	2時間	点滴				
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下								
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ		2病日に休薬完了			