

(腎がん007)【400mg】キイトルーダ・インライタ
化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID
患者氏名 @PATIENTNAME
診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

キイトルーダ・インライタ療法			
	day1		day43
キイトルーダ（ペンプロリズマズ）	↓		↓
インライタ（アキシチニブ）			
キイトルーダ	400mg/body	6週毎	
インライタ錠	1回5mg 1日2回	連日	
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠			
カロナール錠500mg 1～2錠	をキイトルーダ投与前90分（±30分）内服		
注意！下記の場合は、キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。			
◆副作用（間質性肺炎・炎症性腸疾患）でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用			
→キイトルーダのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用（間質性肺炎）でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン（シクロホスファミド）適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『（その他の肺がん003）CPAパルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	400mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			42病日に休薬完了	
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS100mg（ ）mg		2時間	点滴
	* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下			
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
			2病日に休薬完了	