

(尿路上皮がん022)パドセブ+キイトルーダ

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルター使用				
day01				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	注射用水	20ml		
	パドセブ	()	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	キイトルーダ	200mg	30分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			7病日に休薬完了	
day8				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	注射用水	20ml		
	パドセブ	()	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			14病日に休薬完了	
※パドセブは1Vあたり3.3mLの注射用水で溶解				
【副作用】インフリキシマブBS				
注意！パドセブ+キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。				
* インラインフィルター使用				
Rp.1	生理食塩液	250ml		
	インフリキシマブBS	100mg ()mg	2時間	点滴
* 点滴開始15分は40ml/hで滴下、以降125ml/hで滴下				
Rp.2	生理食塩液	50ml	フラッシュ	
			2病日に休薬完了	

パドセブ+キイトルーダ療法		21日/コース	
	day1	day8	day22
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	↓		↓
パドセブ(エンホルツマブ ペドテン)	↓	↓	↓
パドセブ	1.25 mg/kg		
キイトルーダ	200mg		
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。			
レスタミンコーワ錠10mg 5錠			
カロナール錠500mg 1〜2錠 をキイトルーダ投与前90分(±30分)内服			
注意！下記の場合は、パドセブ+キイトルーダの休薬完了を移動しなければオーダできません。			
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合			
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用			
→パドセブ+キイトルーダのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用			
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合			
エンドキサン(シクロホスファミド) 適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与			
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄