

(肝がん009)アバスチン・テセントリク

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

日

アバスチン+テセントリク療法				21日/1コース
	1日目		22日目	
アバスチン	↓		↓	
テセントリク	↓		↓	
【参考】				
アバスチン	15mg/kg			
テセントリク	1200mg			
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可				
※テセントリク投与時間: 2回目以降は30分に短縮可				
Grade2以上のInfusion reactionが発生した場合には次回投与時には以下の前処置を行う。				
レスタミンコーワ錠10mg 5錠				
カロナール錠500mg 1〜2錠 をテセントリク投与前90分(±30分)内服				
注意！下記の場合は、テセントリクの休薬完了を移動しなければオーダーできません。				
◆副作用(間質性肺炎・炎症性腸疾患)でインフリキシマブBSを使用する場合				
インフリキシマブBS 1回5mg/kg 単回投与 間質性肺炎には適応外使用				
→アバスチン・テセントリクのレジメンフォルダ内『【副作用】インフリキシマブBS』を使用				
◆副作用(間質性肺炎)でエンドキサンを使用する場合				
エンドキサン(シクロホスファミド)適応外使用 1回500mg/m ² 単回投与				
→『(その他の肺がん003)CPAパルス』を使用				

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルタールート使用				
①1回目				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	テセントリク	1200mg	60分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	90分	点滴
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
②2回目				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	テセントリク	1200mg	※30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※60分	点滴
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				
③3回目以降				
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	テセントリク	1200mg	※30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.4	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※30分	点滴
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				