

閉鎖式パル輸液セット  
(フィルター付)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

## サイラムザ＋FOLFIRI療法 14日/1コース

次コース

day1

day15

サイラムザ ↓ ↓

イリノテカン ↓ ↓

レボホリナート ↓ ↓

5-FU ↓ ↓

## 【参考】

サイラムザ(ラムシルマブ) 8mg/kg

レボホリナート 200mg/m<sup>2</sup>/dayイリノテカン 150mg/m<sup>2</sup>/day5-FU 急速静注 400mg/m<sup>2</sup>/day持続静注 2400mg/m<sup>2</sup>/day

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。				
*サイラムザはインラインフィルタを使用すること。				
①day01				
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	50ml		
	ポララミン	1A		
	パロノセトロン	1A		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml		
	サイラムザ	( )mg	1時間	点滴
※薬剤部で全量250mlにする				
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴(フラッシュ)
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml		
	レボホリナート	( )mg	2時間	点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	250ml		
	イリノテカン	( )mg	2時間	点滴
Rp.5とRp.6 同時に開始				
Rp.7	5%ブドウ糖	100ml		
	5-FU	( )mg	15分で	急速静注
Rp.8	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.9	生理食塩液50ml	50ml★	インフューザーポンプより	
	5-FU	( )mg	46時間持続	
Rp.10	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
14病日に休薬完了				
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
★サイラムザ投与時間:初回は1時間、2回目以降は30分に短縮可				
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調整する				
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mlLにオーダー変更する				